Frankfurt, den 11.02.2012

Vorbereitung zur Medizinprüfung für TL1

Dr. med. Ortwin Khan

INTERNISTISCHES PRAXISZENTRUM
AM KRANKENHAUS BALSERISCHE STIFTUNG

KARDIOLOGIE - RHEUMATOLOGIE - GASTROENTEROLOGIE - DIABETOLOGIE - SPORTMEDIZIN

Friedrichstr. 21, 35392 Gießen - Telefon (06 41) 97 43 20 oder 79 52-113/-136, Fax 7 74 08
eMail: praxis@gempraxbalserstift.de

Themenkomplexe:

- Herz-Kreislaufsystem
- Atmung und Lunge
- HNO
- Tauchspezifische Probleme
 - Schwimmbadblackout, Hyperventilation, Essoufflement
 - Barotrauma und DCS
 - Atemgasvergiftungen
 - Thermoregulation

Was bedeutet Kreislauf

1. **Aufnahme** von Energie (in Form von Sauerstoff) in den Körper über die Lunge und Übergabe ans Blut

Kreislauf:

2. **Transport** des sauerstoffangereicherten Blutes von der Lunge zu den Organen und Abtransport von CO₂ aus dem Körper

Kreislauf

Blutbestandteile

Das sind 4,5 - 6,5 Liter
bei 80kg Gewicht

Aufgaben des Blutes

Transport

- Atemgase
- Nahrungsmittel
- Stoffwechselprodukte
- Vitamine
- Elektrolyten
- Wärme

Signalübermittlung

- Hormone

Pufferung

- Stabilisierung des Säurehaushaltes

Abwehr körperfremder Stoffe

- Leukozyten

Wundverschluss

- Fibrin, Thrombozyten

Die **Pumpe**
hinter allem:

Kardiologie

- Anatomie und Physiologie
- Herzinfarkt
- Blutdruck und Hypertonie/Schock
- Besonderheit: PFO

Physiologie

- Herz von außen
- transparentes Herz mit Fluß

Welche Aufgabe hat das Herz

- Das Herz pumpt das Blut aus der linken Herzkammer in den Körperkreislauf. Es kommt im rechten Vorhof zurück zum Herzen und wird durch die rechte Herzkammer in den Lungenkreislauf gefördert. Über die Lungenvene gelangt es in den linken Herzvorhof und fließt in die linke Herzkammer

Beschreibe den Blutkreislauf

- Der Kreislauf besteht aus dem Lungenkreislauf und dem Körperkreislauf. Von der Lungen gelangt das Blut über die Lungenvene zur linken Herzhälfte (erst Vorhof dann Kammer), von dort über die Arterien zu den Arteriolen dann zu den Zellen, von dort über die Venolen und Venen zurück zur rechten Herzhälfte, von dort schließlich über die Lungenarterie zurück zur Lunge

Erkläre oder skizziere grob den Aufbau des menschlichen Herzens und den Weg des Blutes durch den Körper

- **Aufbau/Skizze:**
- Obere Hohlvene, Rechter Vorhof, rechte Kammer, Lungenarterie, Lungenvene, linker Vorhof, linke Kammer, Aorta, Scheidewand, evtl. foramen ovale.
- **Weg des Blutes:**
- Vom rechten Vorhof, über die rechte Herzkammer fließt das Blut über die Lungenarterie zur Lunge. Dort erfolgt der Gasaustausch. Das jetzt sauerstoffreiche Blut fließt über die Lungenvene weiter in den linken Herzvorhof, die linke Herzkammer und über die Aorta in den Körperkreislauf.

Nenne ein Beispiel für eine mögliche negative Auswirkung des Tauchens auf die Herztätigkeit (z. B. durch Fehlverhalten).

- **Mögliche Beeinträchtigungen:**
- **Tauchreflex:** Pulsschlag sinkt beim Eintauchen des Gesichtes in kaltes Wasser.
- **Druck auf die Halsschlagader** (z. B. durch die Manschette eines Trockentauchanzuges): Der Blutdruck sinkt und es kann zu einer Ohnmacht kommen.
- **Pressatmung:** Luftanhalten unter Anstrengung, z.B. beim Bergen oder Valsalva-Druckausgleich führt zu erhöhtem Druck im Brustraum. Durch plötzliche Herunterregulierung des Blutdrucks kann es zu einer Ohnmacht kommen.
- Bei einem **Foramen ovale** führt bei Pressatmung der erhöhte Druck im Brustraum zu einer Drucksteigerung im rechten Vorhof und damit zu einem Übertritt von venösem Blut mit Mikroblasen in den arteriellen Kreislauf mit den möglichen Folgen eines Gefäßverschlusses.

Funktionelle Endarterien

- Bei *funktionellen Endarterien* bestehen prinzipiell Kollateralen, sie reichen jedoch im Falle eines Verschlusses nicht als alternative Versorgung aus, (Beispiel Koronararterien)

Herzinfarkt

Blutdruckmessung

Der Blutdruck

Der arterielle Blutdruck schwankt bei jedem Herzschlag zwischen einem Maximalwert (systolischer Blutdruck) und einem Minimalwert (diastolischer Blutdruck)

Hypotonie (Blutunterdruck)	< 105 / 60
Normotonie (Blutnormaldruck)	110 / 70 bis 140 / 90
Hypertonie (Bluthochdruck)	> 160 / 90

Blutdruck: was bedeutet 120/80?

- Systolischer Blutdruck:
Druck zum Zeitpunkt der Pumpaktion
(abhängig von Herzauswurfleistung)
- Diastolischer Blutdruck:
Druck zum Zeitpunkt der Herzentspannung
(„Dauerdruck“ abhängig von Elastizität der
Gefäße)

Gemessen werden: „mmHg“ nicht Pascal

Entwicklung einer hypertensiven Herzkrankheit

Normal

konzentrische
Hypertrophie

exzentrische
Hypertrophie

Hypotonie und Schock

Schockindex

- Der Schockindex ist der Quotient: $\frac{\text{Herzfrequenz}}{\text{RR(syst.)}}$
- Beim Gesunden liegt meist zwischen 0,4 und 0,7:
 - Bei einem Puls von 70/min und einem Blutdruck von 140/80 mmHg beträgt der berechnete Quotient $70/140 = 0,5$.
- Ein Schock soll durch einen Quotienten > 1 diagnostiziert werden
 - Bei einem Puls von 140/min (Tachykardie) und einem Blutdruck von 80/50 mmHg (Hypotension): Schockindex $140/80 = 1,75$.

Schock

Die häufigsten Formen des Schocks

- Volumenmangelschock (Durchfall, Blutverlust, Flüssigkeitsverlust)
- Kardiogener Schock (plötzliche Herzleistungsschwäche, Herzinfarkt)
- Septischer Schock (Vergiftung, Bakteriengifte)
- Neurogener Schock (Vergiftung oder Verletzung des Gehirns)
- Anaphylaktischer (= allergischer) Schock (Insektenstich, Nahrungsmittel, Medikamente)

Schockphasen

SCHOCK

Akutes Versagen der Gewebedurchblutung

Lebensgefahr

durch O₂-Mangel: in den Geweben (Hypoxie), und Übersäuerung des Blutes (Azidose)

Der Schock durchläuft drei Stadien

Zentralisation

Dezentralisation

Irreversibilität

Schocksymptome

- Blutdruckabfall
- Schneller, schwacher Puls
- Blasse, bläuliche Haut (kardiog. und Volumenmangelschock)
- hochrote, trockene Haut bei allergischem Schock
- Kalte, feuchte Haut
- Frieren, Zittern
- Kalter Schweiß auf der Stirn
- Angstgefühl
- Unruhe, Bewusstlosigkeit
- Verminderte/fehlende Urinproduktion

Kardiogener Schock	Hypovolämischer Schock	Neurogener, anaphylaktischer und septischer Schock
Herzinfarkt Herztamponade Arrhythmie Stillstand Lungenembolie	Blutung Verbrennung Dehydratation	Vergiftung Insektenstich Medikamente Infektion
Verminderung der haemodynamischen Leistung des Herzens	Verminderung des Blutvolumens	Verminderung des Gefäßtonus

Bilder zum PFO

5. Schwangerschaftswoche

6. Schwangerschaftswoche

Endokardkissen

PFO

Das persistierende offene Foramen ovale

Spätschäden bei Tauchern

Abb. 5.1 NMR - Befund eines Sporttauchers, die markierten Bereiche deuten auf asymptotische Läsionen im Frontal - und Parietallappen, aus [28]

Aachener Studie

- MRT Studie 1996:
- Sogenannte „Vieltaucher“ haben vermehrt Läsionen im Marklager
- >>> „Panik“ im Taucherlager
- „Tauchen macht dumm“
- Genauere Datenanalyse:
- nur 25 % der Vieltaucher haben diese Läsionen

Häufigkeit des PFO

- 25% aller Menschen haben ein PFO
- 25% aller Taucher haben eine PFO
- Keineswegs 25% aller Taucher haben eine Dekompressionskrankheit erlitten
- Ist das PFO also gefährlich für Taucher ?

Arterio-venöse Shunts

Vereinfachte Darstellung eines Herzens mit einem
offenen Foramen ovale

**Weitere Shunts entstehen
in der Lunge bei erhöhtem
intrapulmonalem Druck
bei zunehmendem Ver-
schluss der kl. Gefäße
durch Mikroblasen.**

Normalerweise sind linke und rechte Herzkammer vollkommen voneinander getrennt. Bei teilweise offenem Foramen ovale gelangen unter besonderen Umständen Mikroblasen vom venösen in den arteriellen Kreislauf.

Diagnostik des PFO

- Transösophageale Echocardiographie mit Echovist
- Doppler nach NaCl-Gabe

Tauchen mit PFO

- Ein nachgewiesenes PFO ist kein Tauchausschlussgrund !!!
- Präventive Maßnahmen
 - Reduktion des Dekompressionsstress (Nitrox benutzen, Nicht-Ausnutzen der Nullzeiten)
 - Vermeiden vermehrter Bläschenbildung
 - Vermeiden von Shunt-provozierenden Druckerhöhungen

Definition Atmung

- Bewegung von Luft (Sauerstoff) in die Alveolen
- Entfernung von CO₂ aus den Alveolen (dies ist die äußere Atmung)

Die Steuerung orientiert sich an:

- Menge des im Körper entstehenden und über die Lunge zu entfernenden CO₂

Zusammensetzung der Atemluft

Anatomie

Und noch mal die Anatomie.....

Rechte Lunge (rechter Lungenflügel)

Linke Lunge (linker Lungenflügel)

Jeder Lungenflügel wird d.Furchen in *Lungenlappen* unterteilt.

Rechts: 3 Lappen mit 10 Segmenten

Links: 2 Lappen mit 9 Segmenten (7. Segment fehlt)

Beschreibe den Aufbau der Lunge (Skizze/stichwortartig)

- Brustraum umschlossen vom Brustkorb
- Rippenfell, Zwerchfell, Lungenfell
- Pleuraspalt, Mittelfellraum (Mediastinum)
- Atemwege: Luftröhre, Bronchien, Alveolen (Lungenbläschen), Kapillaren um die Alveolen
- Linker und rechter Lungenflügel, Lungenlappen, Lungensegmente

Atmung

Abb. 73: Änderung der Druckverhältnisse im Pleuraspalt in Abhängigkeit von der Atemphase

Ein- und Ausatmung im Zusammenhang mit dem Kreislaufsystem

Aufbau einer Alveole

Gasaustausch

Aufbau der Lungenbläschen

Gasaustausch in den Lungenbläschen

Der Weg der Gase

Lungenüberdehnung

Die Vorstufe des Lungenrisses ist die Überdehnung der Lunge, die auch ohne Alveolarrupturen zu einem bleibendem Emphysem führen kann

Lungenriss

- Nach dem Ertrinken häufigste Todesursache beim Tauchen
- Auslöser meist Paniksituation mit krampfhaftem Luftanhalten oder Stimmritzenkrampf. Hierdurch Überdehnung der Alveolen beim Aufstieg und Ruptur der Alveolarmembran.
- Begünstigend wirken: Bullae, Emphysem, Lungenfibrose, Asthma, COPD aber auch Bronchusverschluß durch zähen Schleimpropf (**air-trapping**)
- Cave: Wg. größter Druckänderung sind die letzten Aufstiegsmeter am gefährlichsten.

„Air-trapping“ in der Lunge

Achtung!

Eine Druckdifferenz

von 0,1 bar (10 mmHg)

„Lungenriss“

→ Ruptur der Alveolarmembran,
(entsprechend 750 µm Luft)

Lungenläppchen mit Schleim in den Atemwegen beim Abstieg und während der Inspiration

Verschließender Schleimpfropf mit platzen- den Alveolen beim Aufstieg und Freiwerden von Atemluftblasen

Lungenriss. Verletzte Alveole bei Bronchuseinengung (»Air trapping«)

obular) Emphysema

ung.
irspaces.

Pneumothorax

Mediastinal-emphysem

Zentraler Lungenriß

Der Lungenriß und seine Folgen

Abb. 82: Parietaler (randständiger) Lungenriß

Woran erkennt man einen zentralen Lungenriß?

- Halbseitenlähmung oder andere Sinnesstörungen meist direkt nach dem Tauchgang

Pneumothorax

Verletzung des Lungen- oder Rippenfells mit Lufteintritt in den Pleuraspalt (randständiger Lungenriss) → die betroffene Lungenhälfte fällt zusammen.

Extreme Form: Spannungspneumothorax durch Ventilfunktion der Rissstelle → erhöhter Druck im Pleuraspalt mit Druck auf Herz/Gefäße.

Lungenkollaps Pneumothorax

Bronchitis

Erkläre den Begriff AIR-Trapping und nenne die Verletzungen, die hierdurch entstehen können. Nenne 2 Symptome, 2 „Erste-Hilfe“-Maßnahmen und mindestens 2 mögliche Vorbeugungsmöglichkeiten

Erklärung:

Engl. „Luftfalle, Lufteinschluss“: Verkleben/Verstopfen der kleinsten Luftwege (Bronchiolen) zu den Alveolen während des Tauchgangs mit der Folge einer Lungenüberdehnung in einem Teil der Lunge

Verletzung: Arterielle Gasembolie, Pneumothorax, Mediastinalemphysem

Erste Hilfe Maßnahmen

- Gabe von Sauerstoff
- Erste Hilfe und Reanimation

Vorbeugungsmaßnahmen

- Tauchverbot, wenn erhöhte Schleimbildung in der Lunge zu erwarten ist, z. B.:
 - schon bei leichter Erkältung,
 - bei allergischen, asthmatischen Reaktionen,
 - bei chronischer Bronchitis.
- Schnelles, hastiges Atmen und längeres Luftanhalten während des Tauchens vermeiden.
- Unter Wasser Husten vermeiden.
- Betont langsames Auftauchen.
- Sicherheitsstop einplanen.
- Sorgfältige, regelmäßige Tauchtauglichkeitsuntersuchung
- **Nicht Rauchen!**

Lungenunterdruck- barotrauma

- Das sogenannte Lungenunterdruckbarotrauma hat seine Entstehung meist beim zu schnellen Abtauchen.
- Der Taucher sackt dann, weil er z. B. überbleibt ist, durch und kann seinen Abtrieb auch durch seine Tarierweste nicht mehr schnell genug ausgleichen. Oder aber der Taucher versucht ohne Atemgerät in größere Tiefen zu tauchen. (Cave: Apnoe > 30 Tiefe)
- Die Luft in der Lunge wird dann durch den plötzlich steigenden Aussendruck zusammengepresst und die Lunge versucht dieser Bewegung zu folgen.
- Irgendwann kann aber das Lungengewebe durch seine Vakuumaufhängung an Rippenfell, Mediastinum und Zwerchfell dieser Bewegung nicht mehr folgen und es kommt zuerst zum Lungenödem durch Wasserverschiebungen in die Lunge und bei noch stärkeren Drücken sogar zum Lungenriß.
- Auch ein zu langer Schnorchel oder ein falsch eingestellter Lungenautomat kann auf Dauer durch den erhöhten Atemwiderstand zu einem Lungenödem wegen des herrschenden Unterdrucks führen.

Regulation der Atmung

Das Atemzeitvolumen (auch Atemminutenvolumen genannt) des Menschen wird primär durch die CO₂-Konzentration im arteriellen Blut geregelt.

Die Messung der CO₂-Konzentration erfolgt zum einen durch im Hirnstamm gelegene zentrale Chemorezeptoren und zum anderen durch periphere Chemorezeptoren, die sich im Glomus caroticum und in den Glomera aortica befinden.

Steigt der CO₂-Gehalt im Blut, erhöht sich das Atemzeitvolumen (Vermittlung durch das Atemzentrum).

Eine sekundäre Atemsteuerung (unter Normalbedingungen deutlich geringerer Einfluss) übernehmen Sauerstoff- (kann nur in peripheren Chemorezeptoren gemessen werden) und pH-Rezeptoren, die bei zu niedriger Sauerstoffversorgung bzw. zu niedrigem pH-Wert das Atemzeitvolumen erhöhen.

Hyperventilation

- Die erhöhte Durchlüftung führt kaum zu einer Mehraufnahme von Sauerstoff im Körper, da die Sättigung des Blutes mit Sauerstoff schon bei normaler Atmung etwa 97 % beträgt.
- Allerdings kommt es zur vermehrten Abatmung des im Körper entstehenden Kohlendioxid (=Säure), damit zu einem Verschwinden von Calcium in die Zelle
- Folge „relativer Calciummangel“

Behandlung bei Panikattacke / Hyperventilation

- Demonstratives Bild mit Griff ans Herz oder an den Hals
- Angst im Blick, Unruhe

- Erstmaßnahme: Beruhigung, dann ggf. Beutelrückatmung

A large school of fish swimming in clear, turquoise water. The fish are densely packed and appear to be moving in a coordinated manner. The water is a vibrant, slightly hazy blue-green color.

Essoufflement

deutsch „außer Atem geraten“

Mit zunehmender Tauchtiefe und wachsendem Umgebungsdruck steigt auch die Dichte der Atemluft, sodass Turbulenzen entstehen

Was passiert bei Essoufflement?

Wie erkenne ich Essoufflement?

- Wenn die Luft nicht für einige Sekunden angehalten werden kann
- Wenn Tauchpartner eine sehr hohe Atemfrequenz hat
- Wenn Partner das Zeichen für Essoufflement gibt
- Wenn Lufthunger entsteht und man trotz fehlender Ausrüstungsprobleme nicht genug Luft bekommt

Nenne 4 Faktoren, die ein Essoufflement auslösen können

- Turbulenzen in den Atemwegen durch zu hohe Luftdichte und dadurch erhöhten Atemwiderstand
- Anstrengung beim Tauchen, zu viel Blei, zu schnell
- Schlecht gewartete, falsch eingestellte oder defekte Lungenautomaten
- Nicht ausreichend geöffnete Flaschenventile
- Zu enge Tauchanzüge und zu fest sitzende Begurtungen
- Überanstrengung beim Schnorcheln mit Gerät
- Kälte, Dunkelheit und Angst lassen die Symptome noch schneller eintreten.

Was ist die Folge des „Außer-Atem-geratens“ (Essoufflement) beim Gerätetauchen?

- Die Atmung verschiebt sich in den Bereich des inspiratorischen Reservevolumens
- Es entsteht eine Kohlendioxidvergiftung durch Ermüdung der Atemmuskulatur
- Kohlendioxidvergiftung: Kopfschmerzen, Lufthunger, Schwindel, Bewußtseinstrübung, Bewußtlosigkeit

Hoffentlich konnte ich in diesem Vortrag für etwas Transparenz sorgen.....

Teil 2: Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde

Nasennebenhöhlen

Die Nasennebenhöhlen dienen zur:

- Gewichtsverminderung der Schädelknochen
- (evtl.) als Resonanzraum für den Klang der Stimme

Mit Druckausgleich

Ohne Druckausgleich

Barotrauma:
Entwicklung eines
Kompressionsbarotraumas
in einer starren Körperhöhle

Du hast beim Tauchen heftige, stechende Schmerzen in der Stirngegend. Worum handelt es sich höchstwahrscheinlich?

- Um ein Barotrauma der Stirnhöhle

Nasennebenhölenentzündung

Sinusitis

Nasenbluten

Aufbau und Funktion des Ohres

Hören unter Wasser

Richtungshören über Wasser:

- Auflösungsvermögen des Ohres liegt bei 0,00003s
- Intensität im „näheren“ Ohr höher

Aufgrund der höheren Schallgeschwindigkeit durch geringere Kompressibilität des Wassers ist Schallgeschwindigkeit höher und aufgrund geringerer Dämpfung ist die Reichweite des Schalls größer

Unter Wasser können keine Richtungen und Entfernungen zugeordnet werden

Aufbau des Ohres

Funktion des Gleichgewichtsorganes

Skizziere und beschrifte den Aufbau des menschlichen Ohres (Innenohr nur Grobszizze). Nenne und erlääutere 3 Beispiele für mögliche Schädigungen des Ohres durch Fehlverhalten beim Tauchen sowie richtiges Verhalten, das diese Schädigungen verhindert.

Der Blick ins Ohr

Akute Mittelohrentzündung „otitis media“

Akute Mittelohrentzündung,
Entdifferenzierung, linkes Ohr

Akute Mittelohrentzündung, "schollige
Trübung" des Trommelfelles, linkes Ohr

Paukenrguss

Trommelfellriß

Äußere Gehörgangsentzündung „otitis externa“

Barotrauma der Zähne

A silhouette of a diver is shown against a bright light source at the water's surface, creating a dramatic lens flare effect. The diver is positioned in the upper half of the frame, with their fins and equipment visible. The water is dark and textured with ripples and bubbles.

3. Teil:

Tauchsport - spezifische Probleme
und Krankheitsbilder

A school of fish swimming underwater in clear blue water. The fish are silvery and dark, moving in a coordinated pattern. The background is a deep blue gradient, suggesting an underwater environment.

Themen-Übersicht

- Ertrinken und Schwimmbadtod
- DCS und Barotrauma
- Atemgasvergiftungen
- Thermoregulation
- Dehydratation

Ertrinken und
Schwimmbadtod

Schwimmbad-Blackout

Teildruck in mbar

Blackout beim Apnoetieftauchen

- Beim Abtauchen erhöht sich der Umgebungsdruck
- → erhöhter Innendruck des Thorax durch Kompression
- → erhöhter Sauerstoffpartialdruck
- → man kann bei erhaltenem Bewußtsein O₂-Vorräte tiefer ausschöpfen.

- Aufstieg: Kommt dann der Atemreiz sinkt mit dem Aufstieg der Partialdruck und der Schwellenwert für Blackout wird unterschritten (meist kurz vor der Oberfläche)

Definitionen beim Ertrinkungsunfall

Als eine **Asphyxie** oder die **Asphyxia** (griechisch ασφυξία, *asfíxia*, „die Pulslosigkeit“) wird allgemein ein Zustand mit Kreislaufschwäche und Atemdepression bis Stillstand bezeichnet, der mit Hypoxie und Hyperkapnie einhergeht

Ertrinken ist eine Asphyxie durch Untertauchen in einem flüssigen Medium.

- **Ertrinkungstod:** Untertauchen im Wasser
- **Beinaheertrinken:** Rettung nach Untertauchen
- **nasses Ertrinken:** Ertrinken mit Aspiration
- **trockenes Ertrinken:** Ertrinken ohne Aspiration
- **Einfaches Ertrinken:** Nichtschwimmer, Folge körperlicher Erschöpfung.
- **Ertrinken als Krankheits- oder Unfallfolge:** Unfälle, bei denen das Untergehen nicht primär auf das Wassereindringen in die Luftwege zurückgeht.
- **Ertrinken während des Tauchens:** Laryngospasmus beim Taucher, Hyperventilation vor Tauchversuchen

- **Primäres Ertrinken:** Sofort eintretender Tod durch Untertauchen, Aspiration mit nachfolgender Hypoxie, Hyperkapnie und Azidose.
- **Sekundäres Ertrinken:** verzögert eintretender Tod nach Beinahe-Ertrinken

Stadien des Ertrinkungsvorganges

1. Stadium: Erregungsstadium mit Glottisverschluß und Apnoe.
2. Stadium - Abwehrstadium; tiefe Atemzüge mit Eindringen von Wasser in die Lungen. Nach Lösen des Glottisverschlusses
3. Stadium - Krampfstadium; Krämpfe bis zur kompletten Paralyse infolge von Hypoxie und Hyperkapnie
4. Stadium - Lähmungsstadium mit Kreislaufstillstand.

Schutzmechanismen beim Ertrinkungsunfall

- 1. der Tauchreflex und
- 2. die Hypothermie.

Diese Mechanismen stehen vermutlich mit der günstigen Prognose, insbesondere bei Kindern, nach Eiswasserunfällen in Zusammenhang.

Tauchreflex

- Schutzmechanismus, der bei allen lungenatmenden Lebewesen beim Eintauchen in Wasser beobachtet werden kann.
 - Durch eine Stimulation des Parasympathikus wird die Atmung sistiert,
 - der Herzschlag verlangsamt und der
 - Blutkreislauf zentralisiert.
 - Damit wird der Sauerstoffverbrauch auf die überlebenswichtigen Organe reduziert.
- **Auslöser** : Es spielen unter anderem Rezeptoren auf der Haut in Nähe von Nase und Oberlippe eine Rolle.
- Auch *kalt*es Wasser scheint den Reflex zu verstärken.
- Die Zentralisierung des Herzlungenkreislaufs kann teilweise durch die Kompression der Extremitäten beim Eintritt in das Wasser erklärt werden

Anwendung des Tauchreflexes

- Während beim Neugeborenen dieser Reflex sehr stark ausgeprägt ist, reduziert er sich bereits innerhalb weniger Wochen nach der Geburt.
- Durch regelmäßigen Kontakt mit Wasser verstärkt er sich wieder und lässt sich sogar bewusst trainieren (z.B. beim Apnoetauchen).
- Beim Sportschwimmen sind aus diesem Grunde die Pulswerte deutlich niedriger als bei gleicher körperlicher Belastung an Land.

Trockenes Ertrinken

Ertrinken in Süßwasser und Salzwasser

Ertrinken in Süßwasser

Ertrinken in Salzwasser

Feuchtes Ertrinken (Aspiration)

Sekundäres Ertrinken

Sekundäres Ertrinken

Dekompressionkrankheit und Barotrauma

Sämtliche in der Atemluft enthaltene Gase können bei zunehmendem Umgebungsdruck toxische Wirkungen verursachen:

Stickstoff	→	Tiefenrausch
Kohlendioxid	→	CO ₂ -Narkose
Sauerstoff	→	Sauerstoffkrämpfe

Lunge
Ohren
Nebenhöhlen
Kieferhöhlen
Zähne
Maske

Tiefenrausch
N₂-Vergiftung
O₂-Vergiftung
CO₂-Vergiftung

Magen
Darm
Zähne
Lungenüberdruck
DCS
AGE

	DCS I	DCS II	AGE
Ursachen	Inertgasübersättigung, Ausperlen von N ₂ -Blasen in den Geweben (Haut, Gelenke)	Inertgasübersättigung, Ausperlen von N ₂ -Blasen im Blut, Shunt, autochthone Blasenbildung	Lungenüberdehnung und -riss durch Überschreiten der physiologischen Elastizitätsgrenzen (Notaufstieg, "Air trapping")
Physikalische Gesetze	Dalton und Henry	Dalton und Henry	Boyle-Mariotte
Symptome (Zeitpunkt des Auftretens)	Minuten bis Stunden nach TG, in den meisten Fällen innerhalb von 3 Stunden nach TG	Minuten bis Stunden nach TG, in den meisten Fällen innerhalb von 3 Stunden nach TG	Sofort beim Erreichen der Wasseroberfläche oder kurz danach
Neurologische Ausfälle	Hautsymptome, Missempfindungen, Gelenkschmerzen	Missempfindungen, Lähmungen, starke Müdigkeit und Körperschwäche	Sensibilitätsstörungen, Lähmungen, Bewusstlosigkeit, Tod
Art der Schädigung	Lokale Gewebsschädigung durch ausperlende N ₂ -Blasen	Embolien durch N ₂ -Blasen im ZNS und anderen lebenswichtigen Organen	Embolien durch Atemluftblasen im ZNS und anderen lebenswichtigen Organen
Therapie	normobarer O ₂ , später HBO, Achten auf neue Symptome	Notfallmaßnahmen, normobarer O ₂ , später HBO, evtl. HLW	Notfallmaßnahmen, normobarer O ₂ , später HBO, evtl. HLW
Prophylaxe	Diszipliniertes Tauchen unter Einhaltung der Sicherheitsregeln, evtl. Ausschluss PFO	Diszipliniertes Tauchen unter Einhaltung der Sicherheitsregeln, evtl. Ausschluss PFO	Sorgfältige ärztliche Untersuchung zum Ausschluss von Lungen-/Bronchialerkrankungen, Sicherheitsstopp, evtl. Ausschluss PFO

Abb. 87: Gegenüberstellung von DCS I, DCS II und AGE.

Das Gesetz von Henry

Gasmoleküle über einer Flüssigkeit

Prinzip:

Es gehen genau so viele Gasteilchen in eine physikalische Lösung, wie wieder aus dieser hinaus diffundieren (Sättigungszustand).

Gesetz:

Bei konstanter Temperatur und ausreichend Zeit steht die Menge des in der Flüssigkeit gelösten Gases im direkten Verhältnis zum Druck des über der Flüssigkeit stehenden Gases.

Das Gesetz von Henry

Die **Geschwindigkeit**, mit der die Gasmoleküle in die Flüssigkeit gelangen, hängt ab von:

1. der **Größe der Oberfläche**, an der die Diffusion erfolgen kann;
2. der **Löslichkeit** des Gases in der betreffenden Flüssigkeit.

Sättigungsvorgang

Welche **Menge** an Gasmolekülen (pro Zeiteinheit) aufgenommen werden kann, hängt von dem **Unterschied** zwischen den **Teildrücken** des Gases über der Flüssigkeit und in der Flüssigkeit selbst ab.

Auswirkung auf die Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten

Wie viele Gasteilchen sich im Sättigungszustand lösen können, hängt ab von...

- ... dem **Teildruck** des Gases über der Flüssigkeit;
- ... der **Temperatur** der Flüssigkeit;
- ... der **Löslichkeit** des Gases in der betreffenden Flüssigkeit;
- ... der **Flüssigkeitsmenge**.

Abhängigkeit des Sättigungszustandes

Das Gesetz von Boyle und Mariotte

Druck und Partialdruck

Die Summe aller Teildrücke eines Gasgemisches ergibt den Gesamtdruck
 $P = p_1 + p_2 + \dots + p_n$

Man errechnet den Teildruck eines Gases in einem Gasgemisch, indem man den Gesamtdruck mit dem prozentualen Volumenanteil dieses Teilgases malnimmt. Der Gesamtumgebungsdruck in 30 m Wassertiefe (bezogen auf Meereshöhe)

$$p = \left(\frac{\text{Tauchtiefe}}{10} + 1 \right) \text{ bar}$$

$$p = \left(\frac{30}{10} + 1 \right) \text{ bar}$$

$$p = 4 \text{ bar}$$

Der Sauerstoffteildruck beträgt dann

$$p_{\text{O}_2} = \frac{4 \text{ bar} \cdot 0,21 \text{ bar (lt. Tab.)}}{1 \text{ bar}} = 0,84 \text{ bar}$$

Partial- oder Teildrücke		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar
Sauerstoff	21 %	0,21 bar	0,42 bar	0,63 bar	0,84 bar
Stickstoff	78 %	0,78 bar	1,56 bar	2,34 bar	3,12 bar
Rest	1 %	0,01 bar	0,02 bar	0,03 bar	0,04 bar

Das Gesetz von Dalton

Luftembolie

Akute Lebensgefahr

Übertritt von Luft aus der überdehnten oder gerissenen Lunge (zentraler Lungenriss) in die Lungenvenen → zum Herzen → Körperkreislauf → Gefäßblockade (z. B. Gehirn)

Luftembolie

Arterielle Gasembolie

Stickstoffsättigung in verschiedenen Geweben

Akuter Dekompressionsunfall

Akuter Dekompressionsunfall
auch Caisson oder DCS genannt

Ursache:

Bildung von Gasblasen im Blut oder Gewebe durch zu schnelle Minderung des Umgebungsdruckes

Chronische Dekompressionserkrankung

Chronische Dekompressionserkrankung

Ursache:

»Stumme« Stickstoffbläschen im Knochen- und Knorpelgewebe

Folge:

Langsame Zerstörung dieser Gewebe mit bleibenden Gelenkveränderungen (Arthrosen)

Chronische Dekompressionserkrankung

Deko-Unfall vs. Luftembolie

Dekompressionsunfall

Ziele der DCS-Therapie

Faktoren, die ein DCS begünstigen

Gefahr eines Dekounfalls
steigt durch

Medikamente
Alkoholgenuss
Verletzungen
Stress
Kälte
Körperliche
Belastung
Dehydratation
Fettleibigkeit
Alter

DD: DCS ↔ AGE

Dekompressionserkrankung	Arterielle Gasembolie
Vorgeschichte <ul style="list-style-type: none">- in der Regel längere Tauchzeit- in größerer Tauchtiefe- unterlassene oder fehlerhafte Dekompression- allmählich zunehmende Beschwerden. Auftreten erst nach mehreren Stunden (über 24 Stunden möglich)	Vorgeschichte <ul style="list-style-type: none">- unabhängig von Tauchzeit und -tiefe- auch im Flachwasser- Not-/Panikaufstieg (mangelhaftes Abatmen)- Symptomatik schlagartig, unmittelbar oder wenige Minuten nach Erreichen der Wasseroberfläche
Befunde <ul style="list-style-type: none">- Hautjucken (Tauchflöhe) Hautmarmorierung, rötliche Hautfärbung- Gelenkschmerzen (Bends)- Zeichen einer Lungenembolie- Querschnittslähmung, seltener Halbseitenlähmung- selten primär bewusstlos	Befunde <ul style="list-style-type: none">- Hautemphysem (Schwellung, Schneeballknistern)- (Spannungs-) Pneumothorax- typische Halbseitenlähmung (vorzugsweise linksseitig)- primäre Bewusstlosigkeit (Leitsymptom)

Unterscheidungsmöglichkeiten bei Dekompressionserkrankung und arterieller Gasembolie.

Wann können in einem Körpergewebe gefährliche Gasblasen entstehen?

- Beim Auftauchen, wenn der Stickstoffpartialdruck im Gewebe die kritischen Werte überschreitet

Was unternimmst Du, wenn ein Taucher einen Lungenüberdruckunfall hat?

- Sauerstoffatmung, ggf. Herz-Lungen-Wiederbelebung und möglichst schnell hyperbare Sauerstoffdruckbehandlung in einer Druckkammer.

Was tust Du, wenn einer Deiner Tauchpartner nach dem Tauchgang über Taubheitsgefühle im Bein klagt?

- Ich gehe von einem Dekompressions- oder Lungenüberdruckunfall aus:
 - Sauerstoffgabe
 - Flüssigkeitszufuhr
 - Schockbekämpfung
 - Verunfallten vor Auskühlung schützen
 - Einleitung der Rettungskette
 - Mit dem Patienten reden (Hinweis: solange jemand redet, sind Puls und Atmung vorhanden. Wenn möglich Puls und RR kontrollieren)
 - Erschütterungsarmer Transport
 - Tauchcomputer sichern und dem Notarzt aushändigen (ggf. zur Planung der Druckkammerbehandlung hilfreich)
 - Festhalten der Tauchgangsdaten für den behandelnden Arzt

Wie vollzieht sich die Stickstoffsättigung im Körper?

- Die Lösung des Stickstoffs im Körper verläuft in einigen Geweben schneller als in anderen. Sie ist neben anderen Faktoren auch abhängig von der Durchblutung der Gewebe.

Nenne 8 Symptome (mit Unterscheidung in „leicht“ und „schwer“ und 6 wichtige Maßnahmen zum Notfallmanagement („Erste Hilfe“) bei einer Dekompressionserkrankung

- Leichte Symptome:
 - Müdigkeit
 - kribbelnde und juckende Haut (Taucherflöhe)
 - marmorierte Haut, Hautflecken
 - Schwellungen (Orangenhaut)
 - Schmerzen in und an Gelenken (bends)
 - Schmerzen in Muskulatur wie Muskelkater
- Schwere Symptome:
 - Müdigkeit
 - Atemstörungen
 - Schmerzen hinter Brustbein
 - Hustenreiz
 - Schwindel
 - Bewegungs- u. Koordinationsstör.
 - Seh-Hör und Sprachstörungen
 - Lähmungserscheinungen
 - Engegefühl in der Brust (chokes)

Erste Hilfe bei DCI

- Rettungskette
- Ansprechbarkeit
- Vitalfunktionen
- ggf. HLW
- reiner Sauerstoff
- ggf. Schocklagerung, sonst flach auf den Rücken,
- Bewußtseinskontrolle Atmung und Puls kontrollieren
- Kälteschutz/Wärmeschutz
- Unfallprotokoll erstellen, Ausrüstung sicherstellen, VDST-Hotline

Welches Gas sollte bei einer Druckkammerbehandlung grundsätzlich geatmet werden, und nenne Gründe dafür

- Sauerstoff (hyperbar), da hierdurch ein Druckgefälle zum Stickstoff entsteht und eine Blasenverkleinerung neben der besseren Versorgung der betroffenen Körperbezirke mit Sauerstoff erzielt wird.

Welche Faktoren beeinflussen die Aufsättigung eines Gases in einer Flüssigkeit? Stelle den Zusammenhang zum Tauchen her.

Grundlage konventioneller Rechenmodelle ist das Gasgesetz von Henry

Gase lösen sich in Flüssigkeiten in Abhängigkeit von :

Gesetz		Umsetzung für's Tauchen
➤ Einwirkzeit	➔	Tauchzeit
➤ Temperatur	➔	Temperatur des Gewebes
➤ Partialdruck des Gases über dem Flüssigkeitsspiegel	➔	Druck in der Tauchtiefe
➤ spezifischer Lösungsindex Gas / Flüssigkeit (Gewebe)	➔	spezifischer Lösungsindex Gas / Flüssigkeit (Gewebe)
➤ Verhältnis aus Oberfläche und Flüssigkeitsvolumen	➔	Durchblutung

Atemgasvergiftungen

Gasgrenzwerte (nach VDST) für Sporttaucher

Sauerstoff		(An der Oberfläche 0,21 bar)
	0,16 bar	Absolute Untergrenze in allen Situationen
	1,3 bar	Obergrenze auf Tiefe bei sämtlichen TG mit Gaswechsel
	1,4 bar (66m)	Obergrenze bei allen TG ohne GW und bei nicht idealen Bedingungen
	1,6 bar	Absolute Obergrenze nach Gaswechsel auf Dekostopps oder bei TG mit idealen Bedingungen auf Tiefe, wenn kein Gaswechsel durchgeführt wird.

Stickstoff		(An der Oberfläche 0,79 bar)
	3,16 bar (bei 30m)	Es ist mit ersten Symptomen eines Tiefenrausches zu rechnen
	4,0 bar (bei 40m)	Empfohlene Obergrenze für Sporttaucher (entspricht 40m Wassertiefe, wenn Luft als Atemgas verwendet wird).
	4,74 bar (bei 50m)	Absolute Obergrenze, die bei optimalen Bedingungen noch vertragen werden kann (NOAA)

Atemgasvergiftungen

Sämtliche in der Atemluft enthaltene Gase können bei zunehmendem Umgebungsdruck toxische Wirkungen verursachen:

Stickstoff	=>	Tiefenrausch
Kohlendioxid	=>	CO ₂ -Narkose
Sauerstoff	=>	Sauerstoffkrämpfe

Tiefenrausch

- **Tiefenrausch**, auch Stickstoff- oder Inertgas-Narkose genannt, ist ein rauschartiger Zustand, der beim Tauchen in größeren Tiefen auftritt.
- Obwohl mit Druckluft bereits Tiefen von über 100 Meter (bei Rekordversuchen sogar 133 m bzw. 214 m in Apnoe) erreicht wurden, sind erste Symptome bereits ab einem Stickstoff-Partialdruck von 3,2 bar zu erwarten, was einer Tauchtiefe von ca. 30 Metern entspricht.
- Das Auftreten eines Tiefenrausches hängt jedoch auch von der körperlichen Verfassung (Anstrengung, Stress, Gesundheit, Drogeneinfluss) ab, weswegen vereinzelt auch schon ab einer Tiefe von 20 Metern erste Symptome auftreten können.
- Typische Erscheinungen einer Stickstoffnarkose sind Euphorie, vermindertes Urteilsvermögen, auch was Gefahrensituationen angeht, eingeschränkt logisches Denken, verändertes akustisches Empfinden, metallischer Geschmack und nach dem Tauchgang eine bleibende Müdigkeit.

Welche Aussage zum Tiefenrausch ist richtig?

- Ein Taucher muß in Tiefen über 30 m mit einem Tiefenrausch rechnen

Welches Gas geht im Körper
keine chemische Bindung ein
und wird als Inertgas
bezeichnet?

- Stickstoff

CO₂-Vergiftung

CO₂ -Vergiftung

- Mögliche Quelle: Verbrennungsabgase im DTG.
- Normalerweise enthält die Luft 0,04% CO₂
- Unter erhöhtem Umgebungsdruck kann bei erhöhter Konzentration die Giftigkeitsgrenze überschritten werden.
- Denkbar ist eine Vergiftung auch bei:
 - Atmen aus dem Jacket (Pendelatmung mit Anreicherung) oder bei
 - Totraumatmung durch zu langem Schnorchel
 - Verbrauchter Atemkalkpatrone beim Rebreather
- Der bekannteste Fall der CO₂-Vergiftung ist das Essoufflement

Symptome der CO₂-Vergiftung:

- Lufthunger
- Schweißausbruch
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Übelkeit
- Bewußtseinstrübung

Kohlenmonoxid- Vergiftung

CO-Vergiftung

- Hauptquelle: Verbrennungsmotoren
- Kohlenstoffmonoxid ist ein gefährliches Atemgift. Wenn es z. B. über die Lunge in den Blutkreislauf gelangt ist, bindet es an das zentrale Eisenatom des Hämoglobins und behindert so den Sauerstofftransport im Blut, was zum Tod durch Erstickung führen kann.
- Kohlenmonoxid bindet etwa 325-mal stärker an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin als Sauerstoff
- Bei einem Kohlenmonoxidanteil von 0,1 Prozent in der Atemluft wird etwa die Hälfte der roten Blutkörperchen deaktiviert.

Sauerstoffvergiftung

Sauerstoffvergiftung

Die Symptome einer Sauerstoffvergiftung unterliegen einer großen Bandbreite an Ausprägung und Intensität. Folgende Warnsymptome können, müssen aber nicht eine drohende Sauerstoffvergiftung ankündigen.

- Ängstlichkeit
- Schweißausbrüche
- Schluckauf
- Lufthunger
- Zucken im Gesicht
- Tunnelblick
- Blitz- und Flimmer-Empfindungen
- Schwindel
- veränderter Höreindruck
- Puls/Druckanstieg

Sauerstoffvergiftung II

- Bei zu hohem Sauerstoffteildruck ($> 1,7$ bar) können plötzlich und ohne Vorwarnung Krampfanfälle auftreten, welche epileptischen Anfällen gleichen. Diese Krampfanfälle hinterlassen in der Regel keine direkten Folgeschäden und enden spontan innerhalb 1-5 Minuten nach Normalisierung des Sauerstoffteildrucks ($= 0,21$ bar). Danach folgt in der Regel eine Bewusstlosigkeit von 5-10 Minuten.
- Gelegentlich kommt es zu unkontrolliertem Stuhlgang. Große Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen sind zu erwarten. Als Langzeitfolge kann es zu Lungenschädigungen kommen.

Sauerstoffverträglichkeit

Die Toleranz eines Menschen gegenüber einem erhöhtem Sauerstoffpartialdruck wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst.

- Umgebungstemperatur im Wasser (schnellere Auskühlung)
- Erhöhte Arbeitsleistung (höherer Luftkonsum)
- Erhöhtes PCO₂ in der Atemluft
- Repetitive O₂-Belastung des Körpers
- Überfunktion der Schilddrüse (Hyperthyreose)
- Unterzuckerung im Blut (Hypoglykämie)
- Fieber
- Medikamente, wie z. B. Aspirin, Steroide (Kortison), Insulin, Azetazolamid, Katecholamine (Adrenalin), hochdosiertes Penicillin, hochdosiertes Vitamin C, Kokain

Thermoregulation

Thermoregulation

Medium	Temperatur °C	Verweildauer	Rektaltemperatur
Luft	+ 1 °C	4 h	36 °C
Wasser	+ 1 °C	1 h	25 °C
Luft	- 6 °C	14 h	25 °C

Tab. 3.2: Temperaturabfall in verschiedenen Medien

Unterkühlung

Phase	Kerntemperatur	Symptome
1. Phase <i>Abwehrphase</i>	37 – 34 °C	<ul style="list-style-type: none">- Zittern, Gänsehaut- erhöhter Puls- erhöhter Blutdruck- erhöhte Atmung
2. Phase <i>Erschöpfungsphase</i>	34 – 31 °C	<ul style="list-style-type: none">- Teilnahmslosigkeit- Schlafbedürfnis- Muskelstarre- Herzrhythmusstörungen- Puls- und Blutdruckabfall
3. Phase <i>Lähmungsphase</i>	31 – 22 °C	<ul style="list-style-type: none">- Scheintod- Reflexlosigkeit- Atemstillstand- Herzstillstand

Unterkühlung

Körperkern / Körperschale

Hypothermie / Erfrierung

Erkennen:

- Grau-weiße Verfärbungen der erfrorenen Körperteile
- Empfindungslosigkeit an den erfrorenen Stellen
- Evtl. Blasenbildung
- Eiskalte Haut

Drei Erfrierungsgrade:

1. Siehe oben. Wiedererwärmung der betroffenen Körperteile möglich
2. Blau-violette Verfärbung, Blasenbildung auf der Haut (Ödeme), Wiedererwärmung noch möglich
3. Nach Wiedererwärmung keine Durchblutung, Absterben von Zellen aller Schichten

Hyperthermie

Wärmeübertragung

Wärmestrahlung	Wärmeleitung	Konvektion	Verdunstung
Elektromagnetische Schwingungen, die von jedem warmen Objekt ausgehen → Mikrowelle	Kontakt zwischen unterschiedlich warmen Objekten → Herdplatte	Durch Bewegung des Umgebungsmediums → Wind	Verdunstung von Flüssigkeit über Lunge und/oder Haut → Schwitzen
Störung der Wärmeübertragung/Wärmeabgabe			
Umgebungsstrahlung > Eigenstrahlung	Temperatur des Umgebungsmediums > 37 °C	Kein »Lüftchen«	Taucheranzug, hohe Luftfeuchtigkeit

Wärmeübertragung

Hyperthermie / Überwärmung

Hitzeschäden

Symptome

Ursachen

Hitzekrämpfe

Muskelzuckungen
Später Muskelkrämpfe
Evtl. Bewusstlosigkeit

Hoher Flüssigkeits-
und Salzverlust durch
Schwitzen

Hitzekollaps

Gerötete Haut, Schweiß
Schwindel, Sehstörung
Kreislaufversagen

Akuter Blutdruckabfall
durch weitgestellte
Hautgefäße

Hitzschlag

Kopfschmerzen
Schwäche, Schwindel
Bewusstlosigkeit
Kreislaufversagen

Verhinderung der
Wärmeabgabe durch
Taucheranzug oder
hohe Luftfeuchtigkeit

Sonnenstich

Kopfschmerzen,
Schwäche, Schwindel
Atemlähmung
Kreislaufversagen

Intensive Sonnenbe-
strahlung des Schädels
durch Infrarotstrahlen

Erkläre mögliche Ursachen einer Dehydratation beim Tauchen.
Nenne Symptome und Vorbeugungsmaßnahmen.

Ursachen der Dehydratation:

- Trockene Atemgase
- Harnausscheidung im Wasser
- Seekrankheit, Erbrechen, Durchfall
- Starkes Schwitzen beim Freizeitsport
- Verstärkte Harnausscheidung nach Tee, Kaffee, Alkohol, Medikamente
- Starkes Schwitzen in den Tropen
- Abmagerungskur
- Zu wenig trinken

Vorbeugung der Dehydratation

- 2 Stunden vor dem Tauchen 1/2-3/4 Liter Flüssigkeit trinken
- Kurz vor dem Tauchgang erneut kleinere Menge Flüssigkeit trinken
- Zwischen und nach den TG trinken
- Kein Kaffee, Tee, Alkohol
- Geeignet sind Wasser (mit Saft) und Elektrolytgetränke
- Vor und während des Fliegens zusätzlich trinken
- Direkten Sonnenkontakt vermeiden
- Angemessene Tauchbekleidung tragen
- Körperliche Anstrengung vor und zwischen den TG vermeiden

Nenne mindestens 4 Symptome und die Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einer Verletzung an einer stark nesselnden Qualle!

- **Symptome**

- leichter Juckreiz bis stark brennender Schmerz
- Rötung, Schwellung, Blasenbildung und Quaddeln (flüssigkeitsgefüllt)
- Kopfschmerzen
- Temperaturerhöhung und Schüttelfrost
- evtl. allergische Reaktion von Haut, ZNS, Lunge, Magen
- evtl. Kreislaufstörung bis -versagen, Schockzustand, Bewusstlosigkeit, Lähmungen

- **Erste Hilfe**

- Keinesfalls Schleimfilm mit noch nesselnden Kapseln abwischen
- Verletzung abtrocknen lassen oder mit Alkohol oder Salmiaklösung übergießen
- Bei leichten Verletzungen Brand- und Wundgel auftragen, sonst Arzt aufsuchen
- Ggf. Schockbekämpfung, Reanimation, dann Rettungskette aktivieren